

Toxoïde autogène de *Clostridium perfringens*

Pour usage vétérinaire seulement

Perm. can. établ. prod. biol. vét. n° 59

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES

1. Pour la vaccination d'animaux en santé contre le(s) microorganisme(s) utilisé(s) comme souche(s) mère(s) à partir d'isolat(s) obtenu(s) d'animaux à la ferme ou dans l'élevage d'origine.
2. Les produits biologiques autogènes sont utilisés dans les situations d'urgence, lorsque aucun produit homologué n'est disponible pour prévenir la propagation d'une maladie à des animaux sains.
3. La puissance et l'efficacité de ce produit n'ont pas été établies.
4. Ce produit a été préparé en vue de son utilisation exclusive par un vétérinaire licencié et sous la supervision directe de celui-ci à la ferme ou dans l'élevage d'où provient l'isolat ou les isolats.

MODE D'EMPLOI

Le vétérinaire traitant reste seul juge de la posologie, de la fréquence d'application et de l'indication d'un produit biologique, selon chaque cas clinique. Cependant, il est possible de faire état de la posologie la plus habituelle :

Posologie :	Doses moyennes	Adultes	Jeunes	Voie d'injection
	Bovins/Ovins/Caprins	3 mL	2 mL	S/C
	Porcins	3 mL	2 mL	I/M
	Volailles	1 mL	0,5 mL	S/C
	Lapins	1 mL	1 mL	S/C

S/C : sous-cutanée

I/M : intramusculaire

Amener le produit à la température de la pièce avant l'injection (minimum 1 heure).

Bien agiter afin de reconstituer la suspension homogène avant chaque utilisation.

Toute injection doit être faite aseptiquement.

Fréquence :

Deux fois une dose à 15 jours d'intervalle minimum. Des délais de 3 à 4 semaines et même 6 semaines pouvant être préconisés.

MISE EN GARDE

Une fois le contenant ouvert, utiliser le contenu en entier.

Brûler les flacons et tout contenu inutilisé.

Garder le produit à une température comprise entre 2 °C et 8 °C, à l'abri de la lumière.

Péremption : 1 an après la production. Voir l'étiquette pour la date de péremption de cette série.

Ne pas vacciner dans les 21 jours précédant l'abattage.

À suivre lors de l'emploi de toxoïdes autogènes afin d'éviter les réactions anaphylactiques chez tous les animaux.

1. Ce produit contient un adjuvant (hydroxyde d'aluminium).
2. Ce produit peut contenir jusqu'à 0,3 % de formaldéhyde résiduel.
3. Lorsque le choc anaphylactique est à redouter, employer les diverses médications préventives (antihistaminiques et tonocardiaques).
4. Surveiller étroitement les animaux vaccinés pendant les heures qui suivent les injections.

**ATTENTION : UNE INJECTION ACCIDENTELLE CHEZ L'HOMME PEUT ENTRAÎNER
UNE RÉACTION INFLAMMATOIRE LOCALE GRAVE.**

Ce que vous devez faire en cas d'injection accidentelle chez l'homme :

1. Désinfecter le site d'injection avec un antiseptique.
2. Mettre de la glace.
3. Consulter rapidement un médecin avec le flacon et la notice du produit.



VACCI-VET INC.
SOLUTIONS VACCINALES • VACCINE SOLUTIONS

Fabriqués par Vacca-Vet inc.

4397, avenue Beaudry
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W2 Canada

Tél. : 450 250.3100 – Téléc. : 450 250.3101

Courriel : info@vacca-vet.com